

防除用医薬部外品

PCO専用  
ゴキブリ駆除剤

# イヤローチP<sup>®</sup>

## 成分

イミプロトリン（ラルル）

## 効能・効果

ゴキブリ（油虫）、ノミ、ナンキンムシ、イエダニの駆除


## 特長

従来のエアゾールと比較して、卓越したフラッシング効果とノックダウン効果を示します。

## 性能試験結果


供試虫：チャバネゴキブリ *Blattella germanica* 予研系（感受性系統）

### ■フラッシング効果



\* 供試虫が、30秒間でフラッシングする割合 (%)

### ■ノックダウン効果



\* 供試虫が、15秒間でノックダウンする割合 (%)

## 効能・効果

上部にある押しボタンをおして、小型害虫（チャバネゴキブリ、ノミ、ナンキンムシ及びイエダニ）には約1～2秒、大型害虫（クロゴキブリ等）には約6～8秒直接噴霧する。また、害虫の逃げ込んだ隙間には約1～2秒噴霧する。

噴霧しにくい狭い場所に使用するときには、添付の細管（ノズル）を噴射口に挿入して使用する。

## 使用上の注意

### ① 使用に際しての注意

- 定められた用法・用量を厳守すること。
- 皮膚、飲食物、食器、小児のおもちゃ、観賞魚、小鳥などのペット類、飼料、植物にかからないようにすること。
- アレルギー症状やカブレなどを起こしやすい体質の人は薬剤に触れないようにすること。

### ② 使用中又は使用後の注意

- ノズル（押しボタン）を交換する場合は、噴射口を下に向けるなどして人体にかからないようにすること。
- 噴射中は噴射する人以外の入室を避け、噴射後は室内の空気が外気と入れ換わってから入室すること。
- 人体に向かって噴射しないこと。噴射気体を直接吸入しないこと。
- 薬剤が皮膚についたときは、石鹸と水でよく洗うこと。
- 万一、誤って大量に吸入するなどして、体調に異常を感じた場合は、本品の販売名と販売会社名及び本品がピレスロイド系殺虫剤であることを医師に告げて、直ちに診察を受けること。

### ③ 保管上の注意

- 直射日光や火気を避け、涼しい場所で、小児の手の届かないところに保管すること。
- 暖房器具（ファンヒーター等）の周囲は、温度が上がり破裂する危険があるので置かないこと。
- 缶のさびを防ぐために、水回りや湿気の多い場所に置かないこと。

### ④ 廃棄上の注意

- 捨てるときは、火気のない屋外で噴射音が消えるまでガスを抜くこと。

 住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社

〒541-0045

大阪府大阪市中央区道修町2-2-8

TEL 06-6223-7537

FAX 06-6223-7538

●代理店